

16

KRABBEOVA
BOLEST

Krabbeova bolest također je poznata i kao leukodistrofija globoidnih stanica. Krabbeova bolest nasljedni je poremećaj, što znači da roditelji gene za bolest prenose djetetu. Budući da se radi o nasljednoj bolesti, parovi mogu imati više od jednog djeteta s ovom bolešću. Ovo je rijetka bolest. Iako starija djeca mogu oboljeti od ove bolesti, ona obično pogađa dojenčad mlađu od šest mjeseci.

Vrste Krabbeove bolesti

Dvije su vrste Krabbeove bolesti: Infantilna se javlja kod dojenčadi mlađe od šest mjeseci. Kasna se može pojaviti bilo kada. Posljedice ove bolesti mogu biti teške i dovesti do smrti.

Kod osoba oboljelih od Krabbeove bolesti tijelo ne može stvarati enzim koji se zove galaktozilceramidaza. To dovodi do gubitka mijelina

koji štiti živce u tijelu, a time i do oštećenja živaca. Ovo oštećenje živaca sprečava mozak da šalje signale tijelu, što dovodi do simptoma Krabbeove bolesti.

Simptomi Krabbeove bolesti
Simptomi infantilne Krabbeove bolesti obično se javljaju kada dijete navrši šest mjeseci.

Neki od prvih simptoma ove bolesti uključuju:

- Neobičnu uznemirenost ili razdražljivost
- Loše hranjenje
- Slabost ili ukočenost mišića
- Neobjašnjive vrućice
- Kako bolest napreduje, drugi simptomi mogu uključivati:
- Napadaje
- Gubitak sluha
- Gubitak vida
- Bol u žilcima u šakama i stopalima
- Nemogućnost kretanja i gutanja

Kod oblika Krabbeove bolesti koji se kasno javlja, simptomi mogu uključivati:

- Slabost ili ukočenost mišića
- Probleme s hodaњem
- Gubitak sluha ili vida
- Napadaje
- Smanjenje mentalnih sposobnosti

Trenutno nema lijeka za Krabbeovu bolest. Djeca s ovom bolešću imaju koristi od potporne terapije i pomnog praćenja napredovanja svoje bolesti. Transplantacija krvi iz pupkovine produžila je život velikog broja djece. Transplantacija nije prikladna za svu djecu, ali liječnik vašeg djeteta može s vama razgovarati o ovoj opciji.